

대장내시경 안내문(하프렙산)

성명 : 예약 시간 : 월 일 (오전) (오후) 시 분

1. 검사 전 준비사항

▶ 준비물 : 총 하프렙 A제 - 4포, B제 - 4포, 엔도콜 1포, 메이킨 2알

※ 오전/오후검진 시, 대장약 복용법이 다르므로 내원 시간 확인 후 복용하시기 바랍니다.

검진 7일 전부터

▶ 항혈소판제제, 항응고제 중단 필요 약물 확인
(※ 해당약물 및 중단기간 뒷면 1번 문항 확인)

검진 3일 전부터

▶ 씨 있는 과일(키위, 멜론, 참외, 포도, 수박, 딸기), 해조류(김, 미역), 곡류(현미, 흑미), 견과류(땅콩, 잣, 호두, 아몬드), 김치류 등은 드시지 마시고, 일반 식사를 하십시오.
- 추천 음식 : 백미, 두부, 감자, 계란 맑은국(무국), 생선, 빵, 우동, 알맹이 없는 주스

2. 검사 전날 식사방법

검진 전날 식사방법
(오전 대장예약자)

▶ 아침 : 가벼운 일반식
▶ 점심 : 가볍게 미음 또는 흰죽을 반찬 없이 드십시오. (아침햇살, 두유 가능)
▶ 저녁 : 금식 (생수는 드셔도 됩니다.)

검진 전날 식사방법
(오후 대장예약자)

▶ 아침, 점심 : 가벼운 일반식
▶ 저녁 : 가볍게 미음 또는 흰죽을 반찬 없이 드십시오. (아침햇살, 두유 가능)

3. 하프렙산 조제법 및 복용방법

① 하프렙산
조제법

A제 1포와
B제 1포를
동봉된 500ml 용기에
넣고 차가운 물을
표시선까지 채운 후
흔들어 줍니다.




② 하프렙산
복용법

①의 과정에서 조제한
하프렙산 용액 500ml를
250ml씩 15분 간격으로
총 2번으로 나누어
복용합니다.



4. 오전에 검사하시는 분

① 검진 전날
저녁 7시에
메이킨 2알을
먼저 복용



메이킨 2알

② 검진 전날 저녁 7시



조제한 하프렙산 500ml x 2통을 1시간 동안
복용합니다. 추가로 생수 1L를 마십니다.


③ 검진 당일 오전 4시



전날 저녁과 동일하게 복용하고, 마지막으로
엔도콜 1포를 복용합니다.
(※ 그 이후로는 물도 드시지 마십시오.)

5. 오후에 검사하시는 분

① 검진 당일
오전 5시에
메이킨 2알을
먼저 복용



메이킨 2알

② 검진 당일 오전 5시



조제한 하프렙산 500ml x 2통을 1시간 동안
복용합니다. 추가로 생수 1L를 마십니다.

③ 검진 당일 오전 7시



1차 방법과 동일하게 복용하고, 마지막으로
엔도콜 1포를 복용합니다.
(※ 그 이후로는 물도 드시지 마십시오.)

⇒ 뒷면 계속

내시경 전 중단해야 할 약물

1. 다음 중 복용 중인 약물이 있는 경우 임의 중단시에는 심뇌혈관 합병증의 위험이 있으므로 반드시 담당의(처방의사) 상담 후 중단하시고 내원 바랍니다. 미 중단 시 내시경 검사는 가능하지만 용종제거 또는 조직검사는 불가능합니다.

해 당 약 물	중단 기간
항혈소판제제(에피엔트, 브릴린타)	7일
항혈소판제제(아스피린, 아스트릭스, 실로스타졸, 프레탈, 티클로피딘, 디피리다몰, 클로피도그렐, 플라빅스, 유니버거정 등)	5일
항응고제(자렐토, 엘리퀴스, 프라닥스, 리시아나 등)	3일

- ▶ 항응고제 중 와파린, 쿠마딘은 중단하지 마시고 전날까지 복용 후 내원바랍니다.
대장내시경 검사는 가능하지만 용종제거 또는 조직검사는 불가능합니다.

2. 호흡기 질환, 간경화, 뇌질환, 신장이나 심장질환, 출혈성질환, 약물에 대한 과민반응, 최근 수술 여부, 감염성질환이 있는 분도 반드시 담당의사와 미리 상의하셔야 합니다.

3. 대장내시경 전처치제를 모두 복용하셔야만 검사가 가능합니다.

※ 75세 이상 수면 내시경 불가

검진 전 주의사항

1. 검사전날 물 대신 적색 또는 포도색의 착색음료, 탄산음료는 절대 드시면 안됩니다.
2. 검사 전날과 당일 아침에 물 같은 변이 나와야 장 정결이 잘 된 것입니다.
모두 배변하십시오.
3. 대장내시경 검사는 항문으로 대장내시경을 삽입하여 대장 점막을 직접 눈으로 관찰하여 장의 염증, 궤양, 용종, 악성 종양 등의 질환을 진단하는 검사입니다. 그러므로 대장내시경 검사 전 음식조절과 복용법에 따라 섭취한 후 검사를 받는 것이 좋습니다. 장정결이 불량하여 시야 확보의 어려움이 있는 경우 정확한 검사가 어렵고 이로 인해 재검사가 필요한 경우 당일 진행이 불가하고 추후 예약 후 재검사 시행하게 됩니다.(추가 비용 발생)
4. 2주 이내 비행계획이 있으시면, 시술(용종절제술)이 제한이 될 수 있습니다.
5. 용종크기에 따라 출혈의 위험성이 있는 병변의 경우 타병원에서 용종절제술이 진행 될 수 있습니다. ★조직검사, 용종절제술 시행 시 추가 비용이 발생합니다.
6. 고혈압이 있으신 분은 검사 당일 하프렙산을 모두 복용하신 후 소량의 물과 함께 복용하세요.
7. 당뇨병자 중 당뇨약이나 인슐린 주사를 맞으시는 분은 검진 당일 주사를 맞지 마시고, 당뇨약도 드시지 마세요.
8. 아스피린, 쿠마딘과 같은 항응고제를 복용하거나 녹내장, 전립선 비대증이 있으신 분은 검사 전에 미리 말씀해주세요.

검진 후 주의사항

1. 조직검사를 한 경우에는 대변에 피가 조금 섞여 나올 수 있습니다만, 보통은 곧 멈춥니다.
2. 평소 아스피린 드시던 분은 조직검사를 할 경우, 담당의사와 복용시기를 다시 상의한 후 결정해야 합니다.
3. 공기에 의한 복부팽만으로 인해 복통이 있을 수 있으나, 가스를 배출하면 편해집니다.
4. 진정내시경 약물로 인하여 어지러움, 두통 등이 나타날 수 있으나 수일내에 호전이 됩니다.
5. 검사 당일에는 운전 또는 기계를 다루거나 중요한 결정을 내리는 일을 삼가하시고, 보호자 동반하여 안전하게 귀가할 수 있도록 합니다.

수면 내시경은 마취한 상태에서 시행하는 것이 아니며,
환자의 협조가 가능한 진정상태에서 시행합니다.



※ 문의사항 : 고객센터 ☎ 1644-0808